### ИНСТРУКЦИЯ №06-9392 от 20.07.2005 г.

# **по применению дезинфицирующего средства** "Дезихэнд" производства ООО "Дезиндустрия" (Россия)

Авторы: от НИИ Дезинфектологии Минздрава России - Пантелеева Л.Г., Анисимова Л.И., Родионова Р.П., Сукиасян А.Н.; от ООО "Дезиндустрия" - Зубова Е.Н.; от ГУ ВНИМИ - Кузина Ж.И., Маневич Б.В.

Физико-химические и аналитические методы контроля качества средства представлены OOO "Дезиндустрия" (Россия).

Инструкция предназначена для персонала лечебно-профилактических учреждений, работников дезинфекционных станций, центров государственного санитарно-эпидемиологического надзора и других учреждений, имеющих право заниматься дезинфекционной деятельностью.

#### 1. Общие сведения

1.1. Средство "Дезихэнд" представляет собой готовую к применению прозрачную бесцветную жидкость. В качестве действующего вещества содержит 1,0% хлоргексидина биглюконата. Выпускается в полимерных флаконах объемом от 200 мл до 1000 мл; полимерных канистрах объемом 3л, 5л, 10л, 20л; полимерных бочках до 200л.

Срок годности средства - 2 года со дня изготовления в невскрытой упаковке производителя. Вскрытые флаконы следует хранить ограниченное время не более 6 дней при температуре от  $0^{\circ}$ С до  $+30^{\circ}$ С.

- 1.2. Средство "Дезихэнд" обладает антимикробной активностью в отношении грамотрицательных и грамположтельных (кроме микобактерий туберкулеза) бактерий.
- 1.3. Средство "Дезихэнд" по параметрам острой токсичности при введении в желудок и нанесении на кожу относится к 4 классу малоопасных соединений. Местно-раздражающие, кожно-резорбтивные и сенсибилизирующие свойства в рекомендованном режиме применения у средства не выражены. При ингаляционном воздействии средство малоопасно.
  - 1.4. Средство "Дезихэнд" предназначено в качестве кожного антисептика:
- для гигиенической обработки рук медицинского персонала лечебно-профилактических учреждений, медицинских работников детских дошкольных и школьных учреждений, учреждений соцобеспечения (дома престарелых, инвалидов и т.п.); работников фармацевтических и парфюмерно-косметических предприятий, предприятий пищевой промышленности и общественного питания, объектов коммунальных служб (в том числе косметических салонов и лр.):
- для частичной и полной санитарно гигиенической обработки кожных покровов пациента перед оперативными вмешательствами.

## 2. Применение

# 2.1. Гигиеническая обработка рук

- 2.1.1. С помощью любого дозатора налить на ладонь не менее 5 мл средства и равномерно растереть по поверхности кистей рук до высыхания, но не менее 2 мин. Перед каждой последующей обработкой средством руки вымыть под проточной водой и вытереть полотенцем (при отсутствии воды протереть руки бумажной салфеткой или полотенцем, смоченным водой для удаления остатков средства). Обработку рук в течение дня можно проводить не более 6 раз.
- 2.1.2. После окончания работы руки рекомендуется вымыть водой с мылом и смазать смягчающими средствами.
- 2.1.3. Не рекомендуется доливать в частично опорожненные емкости дозаторов свежий раствор. Остатки старого раствора рекомендуется слить, а емкость промыть питьевой водой.
- 2.2. Санитарно-гигиеническая обработка кожных покровов пациента производится путем принятия ванны в разведении 1л средства на каждые 30 л воды.

#### 3. МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

- 3.1. Использовать только в соответствии с методическими указаниями. При одновременном применении с другими дезинфицирующими средствами или косметическими кремами имеется риск их взаимной инактивации.
- 3.2. Не рекомендуется использовать средство при повышенной чувствительности к хлоргексидину биглюконату.
  - 3.3. Избегать попадания средства в глаза.
- 3.4. Средство следует хранить отдельно от лекарств в защищенном от света месте, недоступном для детей.

# 4. ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ ПРИ СЛУЧАЙНОМ ОТРАВЛЕНИИ

- 4.1. При случайном попадании средства в глаза их следует обильно промыть их водой и закапать 30% раствор сульфацила натрия (альбуцида).
- 4.2. При случайном попадании средства в желудок промыть желудок большим количеством воды и принять адсорбенты: 10-20 таблеток активированного уголь, жженую магнезию (1-2 столовые ложки на стакан воды).